


產論翼

完



產論翼序


事有創於聖設千歲之後起於絕海萬里之隅而出于尋常度量之外別設尺寸奇偉譎怪先生不道古籍無載而不可非者焉蓋事物之變日新無窮而所以待之者亦何有定方夫如是而後天地之理無闕也然是其人必其生稟陰陽之異氣個儻誠慤又必多歷事變致思專一竭終身之知巧而後可與於此也而又輔翼而贊述之者得其人而後可有立後世而不墜也非浮淺輕儇斬名疾利之徒所能庶幾於朝夕也苟能有所斯則雖飲食器械之微其於生養之方豈曰小神而止哉况醫藥生靈久壽形質誠能有所度於古而可傳於後則一從半匕之術生民之受貺蓋有不可量者焉夫天意也人身其大許幾四股百骸彼之所由即此所具孰有以伐柯其則不遠苟能用意

精功驗已而推人其有不得其道者故夷蠻之人目未嘗知中國之書而能自別設術之方而多簡徑可喜取効奇中者豈非以精意專一而然乎謂漢唐諸家之外別無他道則隘矣頃川翁子玄其人忠信專慤其少倜儻好奇節而任俠既治方伎最精砭針按摩之術一日以意救脫隣人婦之蓐厄忽然有函牒同推而試之數人皆如其意積以歲月益精確自信乃立一家之言著產論一篇學無師承又不本古人故其取持論初聞若可驚然皆其所親歷而獨得故簡徑奇中凡產蓐之病其變無方而皆不能逃其尺寸豈所謂冥冥而歷事變能用其意者耶子啓固李氏之子也翁見其脩業精若舉其術與產不授其子而授子啓令以疇其學而子啓乃取翁之書所未備與已之新得者作論并圖翼之而後翁之學無復餘蘊而可不墜於

後云余於方伎之書一無所解故二子之得得失合否固不得而知也但以翁之為人而信其言之不欺以其術之有驗而知其方之不戾矣而以子啓能當翁之選又能羽翼其書而無惑於其為人與學矣抑余又有所懼焉諺曰烏學鸛鶴必死於水懼輕佻之徒視翁之舉耽其名而効之一以禍生靈也廢古人成說忘意肆臆以禍生靈也又懼其徒凶莽滅裂不盡翁之學而禍翁之道也夫必忠信專毅不_怠不_懈但於毀譽不_就不_避於利害如翁而後翁可能也必篤信勤苦如子啓而後翁之道可學也其精微之術書所不能盡者學者何不及翁與子啓之在來而面受之哉

安永乙未孟夏

榮邦彦撰



凡例

一吾門之治姙娠也救護之術什居八九此編亦惟專以明治術為要其術不一一病一術者有之或二術三術者有之法隨症以施其揆一也以備胎前產後之急患示此則雖有諸症亦易與耳

一產論方術時有畧舉而未備者蓋識者聞一知十而昧者瞠若焉先生此舉本不過欲以擴充遺蘊所以名篇曰翼也然而僕輩竊謂此之延津劍合江浦珠雙矣故此編治術湯某凡在彼者此不復贅

一回生鈎胞之二術術意神奧非其人不能用又非筆墨所能盡以故產論只舉其目而已雖然未識此術何以得使當生者起焉初先生之為此編也本欲亦列二術之槩畧既又以雖得其

門而入者猶且難入室何矧私淑紙上之言非唯無益恐却害
久遂止有志之士盍歸來親受面誨以告其微焉

一產椅鎮帶之害孕滔々者天下皆是吾門日夜所務辭辱也而
產論有說殆韶美不復添蛇足

一胎之危生攻補攸分治產之一大準的不可不講此編詳明其
候法及嬰兒保護試乳浴法和盤托出無有虧秘亦誨人不倦
之一編也

一順逆懷孕_{フクコ}孿子生橫礙之諸狀產論及此編及重複已盡之然
尚恐昧者難達也別圖於編末以備參攷

產論翼目錄

乾之卷

按腹

七法

整胎

揆宮

坐草

四條

禁暈

三條

整橫

二條

舉孿

三條

遏崩

二條

納腸

復肛

辨胎

六條

救痼

導水

三條

斷胎

挈倒

四條

拔坐

二條

易蓐

洩閉

五條

飲宮

救瘕

○通計二十術

死胎候法

嬰兒保護

試乳

浴法

產論翼乾之卷

阿列鑿官賀川玄迪子啓甫著土列

羽列

佐藤冲茂德

戸梶升吉夫全校

常列

長中行伯正

按腹

此婦人孕三四月際善用此乃必得其腹內爵氣大散脉絡調
理而惡阻之患亦得速除矣其餘不問老幼男女諸病兼用之
其益不少且此為產科所用諸手法之本原諸手法皆由此而
生故凡欲通梓之諸術者此不可不最先練習熟憤也其用手
之法凡七凡欲施此術者先令其婦人仰臥鑿須就其左邊以
左膝屈抵承其髀杞少帶推壓之意以令不得移動然後先用
兩手於婦胸腹左手覆安心下右手掌當婦胸間以候其虛里

之動消息須雙始入按腰之術其初一手法先以左手掌安
下右手分排指頭從膺上至心下左右肘循其肋骨之間漸下
至心下左手視右手之肘循下亦逐勢漸次下迄臍下而安往
焉次第二手法仍安臍下而用右手食中無名指頭從鳩尾沿
季肋向右脇下章門強按下之又用右手大指頭從鳩尾向左
章門強按下之左右各三遍作之次三手法左手仍安前處而
用右手大指從鳩尾分夾任脉迄臍下強按下之三遍次第四
手法盤先聳腰將左手以其指頭用力緩拘婦人右章門邊右
手食中無名三指頭用力沿右季肋推進向其右不容穴而強
按之左手却逐其勢拘勒腰皮而舉提之將左手仰拘其左章
門邊右手大指頭用力沿左季肋推進向其左不容穴而強按
之左手如前逐其勢拘勒腰向外而舉提之各三遍次第五手

法兩手中食指頭斜相向婦人右小腹上而其八指頭皆用力
按住而抽拽向內復用兩大指相向從左小腹上起指頭用力
按住推送向外作之三遍勢若搖櫓之狀次第六手法送趾堅
左膝聳身將兩手從婦人兩脇向其肘後以其兩指頭分夾其
脊骨第十二三推按抑之使指骨節間有聲而下至十六七推
遶兩手如擁抱狀而舉提之至章門邊兩手用力束勒向腹前
相聚作之三遍是時整宜面婦人下部而坐而當其舉提之時
換腰以頭却面婦人上部次第七手法用兩手食中無名指頭
用力當在脉左右幽門穴迭換徐徐按之治李昉而下至不容
至章門漸々按下已上凡七法其用手須著意為之不可倉卒
為之倉卒則無功矣凡第四第五第用法切不可倉卒使腹
皮牽急先須每於指下微蹙其腹皮以便有餘裕然後彼徐取

引之^ラ前^ニ乃^ニ得其無^キ牽急之患^ヲ

辨胎

方書診婦人妊否^ヲ多載脉例然其言率茫洋如捕風捉影夫古
人非鬼非神鑒幽洞微惡能至斯要不過妄誕附會以奇其事
耳候胎之法產論詳之而近新有得一二舉之以便家生令婦
人仰卧先用產論按腹法更撫摩其兩脚上從股際下向脚大
熟撫數遍而後候之乃得胎浮出全應焉
又視其眼中眼中多白多妊
又妊娘四五月任脉上尋露紫筋
又扪其乳房底有若覆小蓋者多妊
產論謂任脉窪成一道者為寧胎之候然此惟五六月間見之
至八九月一道者即隱不見但腹容左右大張狀有稜角而腹

面却平是為寧子候

又有兒胎天然兩折如弓橫在母腹中者診其左右有物絡自

運動其候大類寧胎切勿誤認

有未產而乳汁出者婦人血氣盛者多有此症方書或名乳泣

而云生子不育者大不然吾數見者此症者分娩後其子皆安

健無事方書之不可信此類甚多矣

整胎

此術蓋理兒胎居偏或胎將墜經若水下或婦人不時顛仆或

致胎動或右足右足寧急難步行者凡此類皆用整胎術而凡

妊娠五六月後時々用此整理其胎乃得兒胎常正而分娩亦

容易產論所舉術甚詳矣而今又新有所謂法已簡易而得効

亦速故重此舉示須兼施之而可也其法令婦人仰臥整坐其

左邊先為按腹第六，手法數遍使胎上浮，當得兒頭偏于右邊。
小腹者則置兩手，指頭以整之。而此時若見有燥屎者，須如
產論所言，揜之而徐與其婦呼吸相適，拘拽至任脉位，用左手
按注却用右手掌按兒臀尻在婦左章門邊者而上之，務令其
軟斜胎得中正。胎既正至脉位時，又須側兩手拘其兒頭上之，
是時匠坐法亦須斜屈婦脚而坐其上之，亦須注一體之力於
其指頭振腰以為之，然後更為按腹第六，手法數遍如是則橫
骨際得疏通，無小便不利之患矣。

救痢

治術病候俱詳于產論，但此症多有燥屎者而妊娠七八月已
後多發，上間亦有五六月發者，然甚罕而救之不早則難得功。
其症皆按其胸下有物奔上，ツキキス匠須及其未衝心前救之，若其已

衝心口鼻出物如糞汁某不得下咽皆自鼻流出者十八九為難治若中噤難得用某者須用拳頭強按石不容穴如產論法當得其口自開又有一種吐舌者必死不可救又有平日多石夫妻反目奴火熾盛因癸此病者凡此症十八九胎墜又癸痛中子宮自開兒頭已臨探之應手者須用回生術及早出之否則其痼症救後亦必遲矣又有痼後繼成狂症者又有痼後崩冒四五日不醒者治方葠連湯第一和劑湯第五和劑湯一味熊膽已上諸方俱有經驗須擇用之如其因致小產者若用回生術後皆宜折衝久後用第三和劑湯類調理之

葠連湯方

人參

一錢用本邦所產者

黃蓮

五分

石二味水一合半煮取一合頓服

第二和劑湯方

黃連 四分 黃芩 四分 大黃 各五分

右以水一合煎之二三沸去滓加辰砂五分攪用

第五和劑湯方

伏苓 半笈 白朮 一錢 青皮 直根人參 各五分

枳實 四分 生薑 五分 石七味水二合煎取一合一勺分服

打衝穴 見產論 第三和劑湯 日上

探宮

此為臨產候胎之法凡產之難易胎之危生順逆橫偏及晚時之遲速等專籍有此術以得預審吉凶者也產論此術附見坐草條下今為初學別作一術以詳辨之
先以頭入婦左腋下令婦以左手靠其肩上
醫石于裏綿衣入婦股間其腕骨承婦肚門坐之而左手向婦腰腹抱持之每陣疼至以右手承肚

門者謂按迎起之陣疼一二至後去所裹綿衣逐裂開手執以
其中指從陰門下邊入探之必從下邊者蓋其上邊因其力息
陰肉脹出不容入指也如其水漿尚在膜中飽滿者待其漲時
爪破之具見產論其辨是膜是兒頭之法摸之其物柔軟若絹
包水按之成凹者是膜也如兒頭硬且有髮須兩指頭撮以驗
之凡子宮開口周寸許而得兒頭應指頭者此為娩期未至之
候及徑二寸許乃是將娩之候醫須其指頭圓轉其兒頭項上
兒頭乃得作勢其生必速矣大抵探宮陰中多濕潤者而極乾
燥者亦有之勿妄謂死胎此是陽氣至盛者耳又有子宮口尚
向後肛門探之不得者此產論所謂胃子宮者此產往屬難理
近得一法須令側臥從陰戶下邊深入指拽正其口使向前而
可也又有口向上者須如前法拽正其口使向下切莫妄謂子

宮無口也

導水

臨產之婦有小便不通者是以兒頭閉塞於陰戶而然也若不
通經時則因以致成腹滿危急之症須令婦人仰臥以右手
大指入陰中推兒頭使下向肛門陰中因此得稍鬆蓄水隨即
得溢出腹滿立減氣急頓平矣又一法須令婦人少開股而立
一鑿以右手食中二指入陰中強勾兒頭引之使下向肛門
此用前術兒頭不接者乃可施此以救之術意雖同得功尤速
雖然若難產疲勞難干起居者後術所難施宜專意依前術必
得其効又有兒頭偏傾右邊不通者須令婦人左側臥以食
中二指推兒頭下向左方得頭稍向中蓄水必隨泄下又此不
通症有力息微止不來者不可謂胎死也以小便閉腹中滿致

氣逆不升降故譬猶飽食飽飲後則氣難下張者爾得小水通
泄力息必復再來也又其小便通有繼見血下者此蓄汚不足
懼也若有如赤豆汁黃汁者下而臭氣甚乃是死胎須用心察
之有胎已死夾于陰戶經日不免暖因脹如鼓逆上癸吐者
此為甚危急之症須先用前術取小便通然後依回生術救之
救後或有水飲大通若暴瀉者如瀝之之婦脉成微細不能
飲食者須用綿衣罨住陰門以令徐徐通之胞衣亦不可急
取若使胞脉瘀血一時俱下恐致陽脫而死須暫時消息禁
食兼進候脉息稍復然後下其胞衣焉

坐草

產論所載有術二條今新又有得三法書以示初學新術三
法第一婉候已至ツキ醫ツキ左膝坐于婦前以頸入婦左腋下而

左肩承婦之胸臆令婦兩手緊持^{十七三}醫帶而^二醫履左手抵婦之
右小腰^{ヨウ}右手從其股間入昂按^ア肛門其次弟二別令^二人就婦背
後以兩手從婦兩腋下入向腹前擁之而其指頭向下其掌貼
撫其任脉之左右微帶下推之意而每陣疼至輒上提之次
第三懸繩於握梁令婦人兩手攀之及兒頭既出產戶鑿以
兩手承持之向陰門上邊扳取適於傍而後使婦安坐以息
之置兒於傍之時須加意防之莫使飲惡露又兒落地後發聲
不速者或有胎帶^{ナラ}左繞其頸一二匝者故切又不可向前引之
恐以絞其咽忽致危殞宜急為^二弛去其胎帶也又初產之婦
分娩之時有或兒頭象物如薄緒者而出此是陰戶內皮蓋
初產之婦內戶肉夾皮脆兒頭逼^ア塞是^二冒之以出者耳若不
知者欲^二弄拔去之產後必致大痛^二醫宜以兩手大指與次指

托兒頭之上_二推之_一向陰中使其自脫然後分娩已上三法並
皆佐尋常壯實產婦坐草之術如臨產經時體已疲者若體水
腫不能坐草者又須捲褥其頭漸高而令側臥醫坐婦前
從股間入_二手以昂_一按其肚門而左手扶婦肩或使人扶之亦
可也或令婦高枕側臥醫坐其背後以昂按其肚門亦可也
又一法婉期已至漿已破逆胎猶在上不得婉經時者救之
之微醫踞尺餘小兒與婦相面兩手指頭向上以其掌按不
容左右令婦兩手緊持醫頭舉體懸任醫左右膝頭著婦小
腹醫仍坐腰反背每陣疼至作之其胎乃自然得下向人門又
有先胎處深接之不得者先用此術後依回生術救其佗臨
產經日臨逆胎因致上逼心下者亦同前如產前患水腫陰
門腫滿跪坐不能兩股相湊衣被溺之亦作痛苦者其

分娩時兒頭腦出必不堪大痛若不早理致艱害而此症非
某物之所能理須三稜針用麻絲扎露鋒可一力刺陰門
分肉處四周無算仍以綿衣罨覆其上輕手搥去其畜水
刺口水出其腫立消其產甚易

又有非水腫而產前後陰門大腫痛其色赤者切不可針若誤
針則血出大痛但須用竜翔飲如上云水腫者其色白針之
不覺其痛 竜翔飲方見產論

近閱清人所著達生編其理孕護胎用布約纏兩道橫束
腰間此推其旨正與本邦用鎮帶者同則其害多非淺鮮也至
云臨產但上床安睡坊忌用力因取譬哺鷄自能啄穀自出
是為時候未到妄用力者言之其理則稍似可聞但其已失之
於平時者豈唯時候未到妄用力者而已哉恨無久航海為彼

民一告此者耳

斷胎

凡斷胎帶有二要附胎者宜短但去血附胞者宜長且不去血
附胎者長宜四五寸須用手指扼之使其帶中黑血不得歸着
而留四五寸用麻線紮之距紮寸許復一紮紮訖後竹刀截
去其兩紮中間所以必短者俗多以中人之臂腕至肘相距間
為度截之者誤也蓋帶長則其乾必遲以此蟠縮着兒腹上
兒往々因致感寒腹痛當深戒所以去血者以血去則易乾故
也附胞帶所以必紮之者以備若胞衣難下之時擊曳易為
為力若不預紮帶中血尽則忽難縮成縮小不便把持也故
如健婦雖不用紮而可也又遇胞衣難下者亟須先斷胎帶使
其兒先就浴為良

禁暈

病候詳見產論而其治術余別又有所得就婦人左邊而立
右手搭其背左手按其腹上衝之物推送之於委食木
暈止更速然其手稍緩輒復發矣故若任產婦在椅中
廼永無平定之期須不放左手仍扶出椅就薦右側卧過一
二時則得平定平定後左右臥從其便而可也上所言之治
產論所云血氣上起與食穀相搏其頭必仰者之暈之術也
又因瘀血衝心而暈者術須先禁暈區以左手大次指緊按
左右不容穴知知則如法右側卧灌折衝飲抽力散類又因
脫血而暈者或即死或二三暈即死尤為難治先須遏血術
詳遏崩條然後依左手按不容之術而後右側卧治方第一
和劑湯或第四和劑湯

折衝飲 見產論

抽刀散 肉桂、鹿脂一味為末，每服一錢，白湯調下，日二三服。

第一和劑湯方 見產論

第四和劑湯方 同上

折倒

產論說此三術甚詳。今新有三術為初學記之。凡用折倒之術，手須輕捷，稍遲，兒則死。若兒死，足腹皆出，而兩臂礙住，不得出者，須令婦人左側臥，從陰門下邊入左中，指當探得兒左肩膊。是時須以其指頭循其膊而漸移，索其臂，灣臂月灣既得，則以指頭拘而引之。其臂乃得屈折而出。又令右側臥，以右手按兒右臂出之。如前兩臂已出，後若兒頭仍拒橫骨不出者，醫當須以綿衣裹兒體，兩手捉持之，向裏面一送。

就勢卽扳乃出若猶不得出者令婦以尻端踞尺餘小
几上盤坐其前綿衣裏兒兩手緊捉從耳腰兩肘後專用力
以引掖之猶不出者令婦頭漸高仰臥匿左手緊曳兒體而右
手中指從陰門下邊入以按應得其兒口顙指頭就以入口
中稍緩左手而右手引一引得兒頭下俯迺出其左手始
緊曳者以兒稍高則不可得其口顙故也用此術者靡不得
免者矣又有頭礙橫骨難出產婆誤強引致有體分裂
而拒留腹中指按之搖滑難取者須令產婦匍匐別使
一人手扪其腹緊々按住推下向小腹不密放手再從依
回生術出之凡逆生者其胞衣多連兒併出以胞元蓋在兒
膏肓上故也

兒手指若肘先露者名曰橫產術見產論然露已及臍者不可復順止直依回生術以救之又橫產有按得其背者須令婦高枕側股仰卧用左手指頭推轉上逆之得其腰曲灣之處即用左指頭從兒股間入拘其體曳之其脚乃出若不出者依回生術救之達生編有治倒生橫法曰急令安睡托入手足再睡一夜自然生其言果是耶今夫平人一有動心不能著腔矧產難之露手足者雖以子萬恩諭無安睡之理何況再睡且如倒生非卒然之變動自胎胎而然以此吾門得妊娠八九月一按腹便知也彼乃又言是時候未至安自用力之故大可笑矣然醫書多妄誕不止一逆生編也噫

拔坐

救坐產術產婦附杆倒條下而其說各狀未詳亦不言用手

之法故北明之凡探宮得子臀尻若後陰若前陰者名坐產而此產余嘗救數十人未見兒盤膝坐者獨其體成兩折頭脚相會脚尖倒朝切乳前者甚多因思古人有坐產之名唯以得其臀尻命之者耳救之之術須使婦前而令婦左側卧伸其脚翻其石脚於匡角上使一人扶持其脚匡豎左膝而坐進身入婦股間而以右手中指入陰中漸指其胎之臀尻使轉向上以索其脚是時當使婦勿息力息則使其兒背愈下脚愈上故也既胎稍得偏移左兒左脚可探陰中亦乃得寬鬆有餘地便可手法施展是時須用心候其胎之穴活胎先須以中指探之挑出兒左脚後令婦右側卧開股豎兩膝兒脚裏綿衣引拔之如捋倒術終坐產見活胎者千百中僅一二耳若死胎依回生術救之

舉寧

○然後使婉之
力息未至○

治術詳見難論而今有緒言一二附列于左凡遇孿胎分娩之時須視其胎差有競意者先出之若夫順產孿者向下者不令婦仰臥惟用坐草術扶之而可也一胎已娩後推其後胎向腹中央用按腹第六術數遍後待婦力息幾至切莫強欲出之若死胎須用回生術若雙逆產見兩兒臀尻者產論不言其術此尤為至難之產若依礙不決必致子母雙斃須令婦仰臥視其胎差有競意者隨其方上之斜側臥匠從其小腹推其胎使向下然後依回生術救之一胎已出後推其後胎向腹中央待力息至然後使婉雖縱得一足須急以綿衣裹引按之有一兒手一兒足奇露者須托其手使入內而持其足急引按之又順產有一時探之得兒頭與肩併出者狀大與雙胎相類宜審辨別

切勿誤認有圖見下凡雙胎一順一逆者其先娩者其兒體必小以其受胎在後故其所處亦近所以先娩如後娩者必大以其受胎在前故其所處亦遠故後娩多滿月之胎先娩多未滿之胎凡孿胎胞衣其大倍尋常須要及子宮未斂口前早出之稍遲取之甚難不可不知也但其出之須候血氣稍定後出之不則恐因致脫血之患

易蓐

難產已救後產母甚疲其衣衾穢汚而難換易者今為之設易蓐之法其法令婦人仰臥ミナリ醫踰婦腹上而背立ウキマカサ令婦兩手攀後ミナリ醫背後帶上以身附之ウキマカサ以兩手左右抱持婦兩股舉之使一人佐舉其頭而舉之用此法搬行婦乃不致搖動可以左右隨便移易其蓐極妙其蓐設高枕等法產論已詳之

過崩

凡卒暴大血脫下者之曰崩崩之因有數種有分娩後產婆欲下胞強按腹動血因致之者有分身後即緊束鎖帶仍逆步就椅因致之者又有癸吧吐輒血大出者又胞未至而崩仍癸暈者尤為極惡候又有因產後房勞而崩者又有平日經行不順二三月閉後忽崩且癸暈者而前數症又有無寒慄者寒慄是為屬血熱又有五十上下婦人經水欲斷忽致崩者凡救崩須急赴之如產論所述而產論言其術唯舉梗槩不致詳細今因詳明之左方醫急右足踣其臥婦脚上而屈左膝斜抱婦右腰着左膝上使伸兩脚其左腿灣自著其右膝臍前抱之法亦須以其左手從婦右肩上進向左腋下抱持之以右手提婦左腿仍張小腹仍戾身微左顧乃得婦陰戶緊閉暴下即止又是

時宜婦頭低若暈者天醫右手按其不容而可也有鎮帶者急
解去灌某脈微細者宜第四和創湯類輕症者宜四物湯艾湯
按腹則痛腹中有塊有力息血熱甚者宜折衝欠大使秘脈數
心下痞鞭面赤逆上者第六和創湯龜騰飲
調理大補湯

又過崩一法

令婦人側臥天醫就背後而坐以一手按婦臀肉一手持婦側臥
在下之足提上之亦可也經閉天崩下者住々後多繼致懷孕
此是以瘀血盡中氣清和故也又有脫下後血虛者手足覺湯
水天滲入者天尤須加調養
第六和創湯

黃連

黃芩

山梔子

大黃

黃蘗

石膏

甘草

右六味以水二合煮取一合三勺溫服

折衝飲方見產論

竜騰欠方日上

大補湯方日上

第四和郁湯方日上

四物膠艾湯方日上

洩閉

此救世呼轉胞者之術而是症難產婦尤多患此者余嘗數救此症診其腹章皆其左小腹水道完邊脹起甚則通腰脹悶如鼓因知此本非真胞了戾者特以其小便不利強起其名者也凡患此者有二種其一臨產兒未出產婆強按其腹內子宮與兒胎相摩_子子宮因致傷腫起脹墜以閉塞尿道而然其一子宮迫下梗_于便道此二症其因雖異其候則同救之之術凡有四其一按腹第六術為之數遍若不通者令婦仰臥匡就其右

脇邊坐疊^{シカサ}聚兩手指頭而按其左水道穴^{シカニキヨモテ}上拘拽向前子宮因
此拘拽起^リ畜水乃出若猶不通者^ニ匠就婦前跪坐尺許小几先
伸進兩臂指頭下^ニ向以掌按婦左右水道穴邊脹起之處此兩
手用力^{キミ}意各不同右以推托為主左以抵拒為主而用其力^カ又須^ク
更以其右膝頭當右肘後骨佐以撐之左膝頭當左肘後骨佐^シ
以支拒之^ニ是時又須令婦以兩手掛匠頸以其身懸任之匠仍
微反^ニ已身而以左顧亦其子宮得拘起而畜水乃出若猶不治
者令婦仰臥匠蹠其膝上^ニ面婦左仍俯以兩手掌側骨
承其水道穴脹起處用力推托上其左右手意畧與前同而此
法尤妙畜水隨手而出又有腹滿每搖動聞水声狀若欲暴瀉
而水却不通者若不遵^ニ此水而腹平暴覺痛必死此蓋分娩後
子宮未收塞在陰中以刺尿道故致然也取時匠須以右手分大

指次指當橫骨上降承其腹而以其掌側骨隔腹皮按其子宮徐々推之令上收乃得畜水隨手通泄可以免危斃矣治方玄英湯危急者錫圭丸

錫圭丸方

大戟 甘薤 蕎麥 各二錢 大黃 八分 巴豆 七分

石五味為末粳米糊丸粟子大每服五六十九白湯送下

納腸

凡腸出者臨產時候未到強令努力因致腸出脫者也若不早收乃乾澀難入以成終年之患甚多納之之法綿衣漬溫湯若煎葱汁頻々換之以蒸溫其腸又以海羅汁若燈油之類塗潤之然後令婦堅兩膝蹲坐匡就其右邊徐取其腸所脫出者先自上邊肉際者起以指襞疊以漸托入之其餘在外者束之作

一處仰右手捱傍陰門以載之五指皆肉向以束持之令婦右手搭ミテ左肩別使久捲ミテ導以帶繫之以此導承婦腰眼遶而又手托承婦頭ミテ以左手托承婦背後令婦身委任而臥則當背反腹脹是時以右手所載腸脊時托送即得モツ去モツ後欲小便須以綿衣ミテ登陰門上徐徐使通不然恐後脫出治方第一和劑湯類可也此本產論斂宮之術而彼以左膝解抵腰後以承婦身臥其術非有臂力者頗難施用今因以捲導代之

斂宮

ナカラフヨリ

一名收宮此亦產時強努力致子宮出ニ後未能斂者斂之之術其上納腸之術同但腸與子宮ミテ難辨ニ今因詳之腸大而無口其色灰白如子宮乃其形圓如曲腰ニ有口向其色赤而有灰白色橫文以托辨之可也又ニ後有胞衣下後破膜向

遺陰戶夾之外見其端者須試展之得展開乃是被膜之餘遺也

也當引拔之
又難產後有遂患小便自利者凡艱產婦人後必多患此症蓋以其分娩時兒頭久夾不出其子宮後遂致天開而不能斂口因致尿道不爽利其小便不覺自出而然若遇患此者當教之令其夜卧常自伸其兩脚三四日後其子宮自得斂口而此患乃除若在產時倚卧不伸脚者必成終身之患矣不可不以丁寧告戒也此症若因又致腹脹者依洩痢術救之 術見前

復肛

令婦人側卧著枕于耳垂下溫湯葱汁之類蒸溫其脫肛海羅燈油之類塗潤之廢疊裹束右手載之令婦身極及就勢推送意一如納腸法即得收口復後須要令大便不結大便結

シカリテ

必復脫出治方
龍騰飲朱明丸類

二方見產論

救症

此小產後角弓反張者救之之術也凡遇此症須急走就其右邊而立以左膝拍婦背後右足之跗當婦右膝前俯身左手托婦左肩以右手大次二指強按婦不容穴匿仍自退其右脚以其脚指與膝頭著地後踵承右臀下而屈折坐是時就其坐勢有時兩手仍前勢以引婦身使其已身相貼依而歛臥之急別使人引伸其兩脚以此術折其反張之勢再不復矣但匿抵其背後之脚要猶著其背後不相離暫時焉通計二十術

死胎候法

凡死胎生胎之候是產科施術緩急豫易之所由分者不明之其誤人必多矣不可不預知也故今緝錄產論中所有候法

散出諸處者尚附所新得一二以為初學開列于左

孕婦患水腫或有不_下能及臨月八九月俄免者多死胎其能至

彌月者此稟賦堅強幸免其死者然千面中有一二而已凡姪

娠八九月因食傷而婉者多死胎凡因食傷而婉者至臨月之

胎其所出婉兒能育者甚少

凡臨產不_下婉經四五日忽乳汁出必是死胎

凡產婦嘔吐不止氣上衝心者死胎

凡陰中出黃汁如赤豆汁者為死胎

凡發子痼者多死胎也少活胎

凡姪中_{顛仆}而婉者多死胎亦多橫生也

凡腰間忽覺若負任者死胎

凡五六月腰八髂_穴邊作陣疼膝下又痛者必小產

凡七八月患熱病_{因努力}而免者多死胎如滿月者不必然

凡臨產其痛_似止力息不來者多死胎

凡患淋疾若瘡疾者多胎墜

凡臨產下水不止探之兒頭不_能動者死胎

凡臨產小便利者是子頭不在橫骨中故非橫逆生則其子既

死腹中也雖然死胎又有不必小便不利者須_{臨時審候}以決

知之

凡初產其痛止在腹而不下腰及肚門者非橫逆生則其子已

死腹中也

凡臨產努力產母聲息細微每_{仰者}死胎

凡破漿後兒已出子宮二寸許而不免經時者其胎必死若尚

胃膜水漿未_{逆者}不必然

凡子未娩其胞衣先下者必死胎且多橫逆生

凡兒腰已下甚大者死胎其大有至如巨柱者名曰壯尻胎

凡兒斜肩子宮出於橫骨下者多死胎

凡破漿後猶下水不止者多死胎

凡雙胎先出而胎小者不育後出而胎大者殯

凡有腫氣者自臨產前三四日水下不絕而不覺胎攪腰腹

又不痛者多死胎

凡坐產露尻者多死胎其活胎者千百中一二而已

嬰兒保護

凡赤子已生斷臍帶後須用五倍子粉糝之以紙全裹之屈曲

安臍上別用絹帶自其背纏束之兒體上附臍處切莫令牽急

恐致兒臍因之突出終身不復兒若頻啼須視臍帶大抵六七

日乃褪落有經フタシヤ二七朝不褪者又褪後倍灸其臍者大不可
也恐小兒不堪火攻之若因癸天吊撮口等病世亦初生者飲
朱砂蜜若甘連湯吾門所用甘連加紅花大黃或鵝鴒昇陽若
桑鷺口瘡紫圓一粒間日用之不知者用二三粒以知為度始
乳之可也是其稟生本資之自然禽獸皆然人何以異世乃有
不待母乳出便雇乳婦者殊不知乳早則胎毒致難下也雖然
如其未滿月而婉若凍賦薄弱者早乳調養亦可也其浴初生
手須輕捷切不可久浴世多有因癸臍凡等病宜深戒之又用
其勇褪落臍帶燒之存性與兒飲之以下胎毒其兒癰瘡疹甚
少驗之屢効又已婉未癸聲前肌溫者不逾三日而死又肌皮
不異者此蓋婉時頭為陰戶所夾瘀血聚結所致須用三稜針
畧破其出血色如煤其腫立消以上嬰兒保護之術所當預讀者

黃白者死又生曰
胎毒起
如胎毒起
與辛乳口

試乳

凡試乳之法先須注之於黑漆器上以視其色淡者為上濃者為下淡蓋血液所化居多濃乃穀味所化居委濃者其未不久而易止且以飲初生小兒性重滯必傷其胃不可不察其乳房扪之堅實若覆碗者為上垂下者為下凡乳來之長短常與經水相為表裏其兒已死者其乳易止而經來必早乳出久者其經或三四年不來古人云在上為乳在下為經者其言似不誣凡產後初出乳汁者勿與飲此蓋數日房中畜積之汁飲之必有害須要數回絞去之後始飲之為可凡乳婦其氣血不和順則其乳不出若其忿怒若勞心傷氣者必忽止又富貴家買乳婦入門一二月往往忽止者人多謂詐騙殊不知不然者蓋其乳婦委卑賤平日家居時放縱恣性驟入貴第法度森嚴身不得

自由氣因致鬱滯是以其乳頻歇不出耳此等事醫亦不可不
略通其故者故此并論之

浴法

浴產前後皆吾門所大禁無輕視妊娠中屢浴者必多患水腫
或病淋疾故妊娠九月已後宜禁浴嘗見因浴致胎動上逼心
下卒就危殞者往々有之是故雖乃暑天亦切不可每日浴但
午前ニ後ニ輕々浴之為妙如產後無他症者經二三日後欲浴者
須以巾漬テスミ熱湯子ウトルニ絞拭去其汚痕如稍重者若艱產後者此拭
亦禁如平穩之婦過二七朝後者其脉症平和始許輕浴為
可而其浴又切不可用浴盆而須用浴桶多設其湯輕浴之
余數見平穩產婦早浴忽發熱氣息短促遂致危斃者甚多
不可不懼也

卷之五

五

王

王

王

王

王

王

王

王

王

產論翼目錄

坤之卷

諸產懷孕圖三十二 附

治驗二十八條

目錄畢

阿州鑿官賀川玄迪子啓鑒定

門人津輕鑿官樋口淳美子成

懷孕圖

同考次

明和壬辰之春子啓先生再蒙藩召來在江戶邸滿城士庶家
迎敷如織門下諸子無不蒙受諄而請益不止先生誨僕等作諸
產形狀圖卑之諸子以補其提耳所闕其圖凡三十二其中蓋


亦有_下產論終未及言其治術者_上雖然識者若提斯圖而以復求
論之微_下者則思過半矣

正產懷孕圖

凡正產之胎背
面側首其胞蓋
胎之尾上其左
右足膝皆展而
旁出其手將則
皆展而依脇傍



正產破漿未逆圖




正產胃子宮圖




子宮口探
微得親頭

正產之得半頭并肩圖




正產探之得願圖




壯尻胎圖

產論所謂子腰已下甚大者也
先胎候法條亦已詳之



壯尻胎露半身圖



正產七八月被膜胎圖




剖膜見胎圖



倒產懷孕圖

凡倒產之胎背
面上首胞衣蓋
于兒背脊之上



倒產先露胞帶圖



倒產胞衣先下圖




倒產露兩足圖




倒產兩足交叉又露一足圖



倒產露下身以肩未出圖




倒產頭項礙橫骨圖




倒產露左足先衣出圖



倒產露一手一足圖




倒產露左足圖




坐產之得臀肛圖




正產歪斜圖




橫產之得背圖




橫產露臂膊圖



橫產露胞衣先出圖



橫產頭手足及胞帶出圖




橫產露子指圖




寧胎正法圖

凡寧胎一側於左而倒首
向下一側於右而豎頸向
上




寧胎雙逆圖




學胎駢首向下圖

已上為學胎駢首法



孿胎雙逆各露兩足圖



寧胎一逆一橫一露一手一足圖



孿胎雙生之得腎屍圖



孕胎奇者寧胎之外又有品胎品胎等蓋造化偶感出奇無窮
僕輩方集此圖請問品胎師云品胎品胎甚罕家君平生治孕胎數
萬僅見一二而已故其法未詳君子於所不知則闕之可也是
以此等數種例不具圖

產論翼坤之卷終

○附錄治驗二十八條

甲午之歲克乞暇而遊受業東門橋先生同盟近藤生者曾
受產術於子啓先生因又得介從事子啓先生乃今產論翼成
矣二子高克以記其治驗附之然而子啓先生之門迎請如
市而無產不艱無艱不起不可勝書雖然此其於事也偶令外
人窺之幸又有猶甚於蜀大跖曰者焉克以忝從門牆未乃不
不自揆乃與二三子相議抄出其最異常可以備後案者以
卷尾云水藩玄亭原昌克謹識

一條坊賣油家婦新姪至五月墮胎後二月而腹仍便々延師
診曰是孕也婦曰自胎墮夫出賁千外矣師曰勿疑予言胎已
七八月但善自防護之可也既滿期而果產母子皆無恙矣
此蓋寧孕而高之又奇者也

四條織羅匹之女因失足墮躓右脚腫大遂成痛楚醫之未瘳
不曰痛凡則曰脚氣延師診之曰是孕也且為品胎皆已死矣
用某者誤亦不可救矣舉家以其處子不信及為出之衆皆
吐舌其明而死

戊

明和成子師應召在藩一村婦有乳後發狂已經八年者此年
復產幸師適在其夫未請之理師為作折衝飲二劑且囑曰並
成加朱砂各四分後朝其夫未謝曰未及前在扶頓退今日則
無所病師乃更為作劑復囑加朱砂四分如前勇夫驚曰僕昨
誤聞教命加至四支耳此可謂郢書燕說矣師每語人曰積年
之病非小劑之所能理也後以為訛資
師在藩時一武弁某氏內人經閉六月以為瘀血瘕之一朝腰
腰帛痛更矣嘔噦某食不下者五晝夜勢已危極衆醫東

予因迎師診視曰是孕也而兒既死矣不速出則母亦斃家人
疑阻將議諸姻族叱曰生死之分界豈緩議之時急與第四和
劑為出之果死胎也時坂東生亦在坐後語人曰師之用術速
牙鑿拔齒

隣里有一尼經閉者累月自以為姙以墮某塗一草根插入牝

戶竟不出後二年而癰臀瘡不堪痛苦因延師乃與揪葉湯其

莖自潰口出瘡亦尋愈

明和辛卯師從公在武城之邸一梨園者之婦數日不產小便

閉腹脹如鼓道中一望而去者不一矣乃介邀師診則兒項

拒留于橫骨間者也曰當先導水令患者左側臥行導術其

其腹一時快利始能飲食因為出之遂得不死

一國侯侍臣在武城邸某姓女坐草不免者十日神脫脈絕

宛矣會師自京來因求療師曰是死胎也為出之頭顱三折

出於是乎父子執弟子之禮

堀川一鍛家妻三十九歲有物稿黑出於陰門二寸許大如筒

不得前沒者四日立起解之則不能消黑則得微通矣醫不

知為何物延師診視同有痛痒子曰無乃指頭搜出之後稍白

色者可三寸割之理如纏筋焉後順利復故

大宮街煙中行事三十三歲經閉十一ヶ月妄認為姪一日腹

內大痛極慍勉強坐草愁楚之聲不絕師診曰是血塊也乃今

將潰所以有痛也其折衝欠下黑血塊大如拳者十八枚調理

旬餘而收功

一村莊室女經閉五月畏醫誤認收破血劑無驗招師診曰是

姪也父母不信後迄九月請診老夫子老夫子因問師曰汝膏

此子生於未日
胎前產後
下本產後
胎前產後

視此女耶曰然曰夫腹大九月而無應者吾恐未為娠也師曰前
診得孕候請待十日而更診之乃旬餘而先夫子與師復診仍
無應者父母又相詰曰何子性格謹厚安得有奸將復用破血之
劑師堅筆以不晚過二十日外胎始應午乃引其母之午以示
之曰是兒頭也是兒午也父母愕然遽具襁褓以待後半歲
而娩前後計十五日而母子皆全

郡村一農婦產後子宮脫不收者五年色黎黑甚堅而其口反
向於下月信至則自其口出師為斂術霍然復故

隣里一婦姙胎暴一男一女胎衣不出吧吐會煩仍多血暈為△
禁之更與折衝不越三日而下皆得輕快師每語人曰胞滯

發暈者全得一救全功難收如是二婦實千百中之一二幸

免鬼錄者耳

十本坊一婦逆產已露全身不出者累日因請師至其家夜半矣診之其胎攣也皆已死蓋先是坐婆強引其頭露之兒項頸挺長但有皮連如線已當師探之時如線之皮已絕去乃為出其全胎者既欲取取其所遺之頭其頭在內轉滑不可捉定探索久之而始得其口乃拘曳出之以產難移日故脈息俱虛無力聞聲先是其婦母病臥其後室其夜丑牌勢極既屬續家族悲泣聲聞于產室婦聞其聲詰問不已繼覺其死乃又悲傷氣勢更疲急其弟四和創且慰且叱因咒者有命悼之何及胡不自重汝今臨危不如生者之不殞其身撫喻數次婦心稍若回者俄又鐘聲連響殷々徹耳報言失大師復慮其驚悸生變乎不離側百端安貼心力俱費竟得無事後語門人曰若使世之產就椅者則其豈得救乎

六條士子坊一高婦歲三十八秋間患病醫其法創成腸簞
肚腹如真坐則不見膝頭衆以為必死置之若棄有人偶延師
診之肋骨歷々如蜘蛛以腹皮脹極連引面皮口眼歪斜悉何
下先與真砂九十錢且日唯食以赤小豆及麥通利漸順出入
歲餘而竟得存生矣量小水凡五斛八斗有餘而竟除飲食而
日用者則一斛六斗

佳吉巷餅匠之女乳後在草蓐手足腫裂扶如大凡師乃與鵲
鵲菜湯下裏及穢物更與四物湯加芩連而康復

朱雀邑一農婦晚後產門下垂一物如囊躬自欲出之持刀子
忍痛貫之意欲以為拳出之已而誤割不堪痛楚因迎師診曰
是子宮脫也則行斂術傷口并遂不覺有痛嗣歲復生育
一內人初妊當坐月一日覺腹內微痛坐臥以為臨盆遂者

同投用催生劑或稱易產奇方珍某紛紛亂投指篋房中須臾
霍然既間二月後痛漸緊坐婆曰莫慮是試疾也又邀前匠者
之匠曰定痞痛也唯忍痛為可耳乃處理痞之前去已而腹痛
至不可堪家人以信匠及坐婆之言不復顧後迨七朝面上全
黑班於是眾人輩始覺其有異同族適有知師者迎而視之婦
声音舉止尚如平日唯六脈數急師出則告家人是猶死屍也
胎柱橫骨而母當胸透回生有術亦難以施胎若一出其斃乃不
待瞬是取胎失其期之過也扁倉亦不能救耳婦果不及婉而
一婦欲婉不婉者累日招師至則既產兒不奈声全面雖縮目
鼻無別婦與穩媼相議曰兒生若此縱令得長醜怪驚人為眾
目所笑噬臍其及乎師曰叱去無他此特產難壓橫骨而然耳
已而不經二時形已復

一寡婦三十五歲經行不來者五月衆臣以為經閉理之遂下
紫黑瘀血者累旬而不已家人皆以為所下味盡故也乃求託
之師診曰是孕也因與膠艾湯十日而血遂止及滿月而果婉
母子俱全師命門人記之

烏丸坊一采戶妻初妊年甫四十產難旬餘綿綿漸就沈滯衆
臣技窮延師診視四體疲極六脉細伏而惡臭滿室告曰胎死
既久矣不亟療母亦斃療亦危家人泣曰病固危急君爺幸
意救之則死而無恨也因為出之婉後劇大熱一身如火昏悶
煩燥口渴引飲極喜熱粥六七碗時或吐沫咬牙日晡五六
則將死用鴈鴒菜湯五劑下死蛔前後十六條黏然得痊可
棚橋氏內人每孕必墮菜餌針灸竟不見寸効兄弟相議託師
婦泣曰妾重身者嘗七不得一正產父母以責妾生兒育三角

則死。不恨。告曰：「有一法，唯恐不從也。」曰：「唯命是從。」師因爲之藥。去鎮帶，與以膠艾湯，且戒之：「夫妻別寢，又禁浴，時會盛夏，連月天旱，彼以信師言，堅守其戒，終無點滴濡身者。」師又爲之，日以整理其胎，遂得及期而舉一女子。次年復孕，亦如前法，復舉一女子。

五條街一穰家，妻年過三旬，經產者凡十一，最後已乳，腰中強硬，不能行，發越三年，百藥無驗。師先用洞當飲，加地黃、黃芩、歸杜仲、午滕，其次日刺左右委中，各一針，隨手而忽起步矣。退數日，甚哉產倚之害人也。

六角坊絹商婦，號後八朝，倏忽暈厥，茶汁不下，衆医不知所理。以危急，延師至，則見家人哭泣者，且解曰：「婦不幸，不能及君之一診，旣逝矣。」師曰：「病癸日，且而今尚未移，唇余且爲視之。」直入

出告傍人曰婦未死此曰痼一身溫和尚可救也皆曰君其勿
欺乎曰救之而不理則命是何忍以不救而死乃行救術氣息
少通脈亦微應乃急濃煎參連頻々灌之夜半稍省人事次日
能言道五朝而瘥

師在出羽時一婦乳後患入門潰爛起步則如刺時々尿牀為
診且探宮陰中有物大如桃核頗類浮石應指而出爾後若一
掃頓快

一門徒備內室胞漿既下不產者七朝德嫗勉強努力身體困
倦腹內猶疼不能側臥一老匠投用附子理中湯益甚先是膏
新產患腳弱受診老夫子以故招師師至未診問曰有鎮帶邪
曰然曰是病之原當去之鎮帶壓胎先所下之水仰脖中餘壓
也於是去以整胎術未半痛頓除更與洞當飲二三劑痛

如常越四十日胎被膜而婉母子并全

堀川煙草戶妻坐月患咳嗽動作無衰師診曰死期在近婉後不越二日果然二三子向其所以曰測法曰虛里動劇者乃急之兆也以故知之

室坊染匠婦經閉三月偶出行遊歸後小便不通者十五朝消滴亦無其幾至於危延師診曰是子宮下墜梗便道也用玄英湯加竹葉投二劑師因創意以尊墊起其腰後候背及腰脹使一人就其右兩手隔腰抵上子宮師以右手食中二指自陰中捺下其子宮口及向上者小水即潰決如泉肚腹頓寬而安洩

閉用是術自此始

田中生妾新產延師至其家則曲屏周圍衣被粘著婦交睫而倚椅診之其腹豐充其乳寬皴而婦出聲曰妾素妻

病產前用藥不少乳汁恐不給育兒師笑曰如是乳房原無
汁之理乃使一婢取其赤子其兒頭圍々蓋經乳已再三易
產者之兒也乃出語曰診之無產後之證彼將給余是必有故
既詢之妾者故祇園一娼妓也生未弱冠時買為妾為作產
外居之後數年無子因更娶他已而其妾與其父好恐被瘞
棄乃密相謀託一尊母買負家之初生之子以詐身也其事
果覺於家婢妾遂放逐

蘭齋賀川先生按腹之術
定氣快胸除痞導流
安胎整診散提撮降
寔賜寔頭全腎
保養保養
定氣
靜氣
漂淳

八十三